

Augustus 2018

In het begin van de maand krijgen we een tweede hittegolf te verwerken. Planten die tot nu de droogte redelijk hadden doorstaan krijgen het nu wel moeilijk. *Davidia involucrata* verliest zeker driekwart van zijn bladeren evenals *Magnolia tripetala*.

Donderdag viel het enorm op dat meer dan de helft van de bladeren geel verkleurd waren, om verder te verdrogen en vier dagen later had de boom deze laten vallen.



Buddleja japonica, wordt dikwijls verward met *Buddleja lindleyana*. Maar *B. japonica* is minder dicht vertakt en de bloemen zijn meer rose tegenover paars bij *B. lindleyana*. Uit Japan waar hij op stenige berghellingen groeit tussen 600 en 1600 m hoogte. De plant verdraagt dus geen natte voeten. Er wordt gezegd dat de struik vorstgevoelig en kortlevend is.

Pileostegia viburnoides, Deze wintergroen klimplant uit China, Taiwan en Indië heeft mooie langwerpige leerachtige bladeren. Volgens recent moleculair onderzoek zou de plant *Hydrangea viburnoides* moeten heten. In ieder geval zoals met ander klimhortensias duurt het enkele jaren alvorens de eerste bloemen te voorschijn komen.





Scutellaria incana, een vaste plant van zo een 80 cm hoog die de zomer perfect heeft doorstaan. Lavendelblauwe bloemen en geschikt voor drogere bodems.



Sinacalia tangutica, is een plant die nog maar één jaar in de tuin groeit. Uit China en behoort tot de Asteraceae. Mooie diep ingesneden bladeren. Ook de vruchtpluizen zouden aantrekkelijk moeten zijn. Geschikt voor half-schaduw.



Veratrum schindleri, eveneens uit China heeft aparte donker rode bloemen.

V. nigrum verschilt met deze door zijn nog donkerde bijna zwarte bloemen in dichtere aren. *Veratrum* groeit in het wild op beschaduwde vochtige plaatsen, dus ook in de tuin is een dergelijke staanplaats vereist.

Boehmeria platanifolia





Dit geslacht bestaat uit meer dan veertig soorten, en behoort tot de Urticaceae.

Vermits de meeste soorten subtropisch tot tropisch zijn, zijn deze planten recent in onze tuinen verschenen.

De grote ingesneden bladeren lopen roodachtig uit. De witte bloemaartjes zijn volgens de meeste niet van tel, maar ik vind ze toch wel opvallend.

Dit jaar heb ik *Boehmeria tricuspis* aangeplant. Deze soort heeft kleinere dieper ingesneden bladeren en zou rode aartjes hebben.



Ampelopsis glandulosa var. *brevipedunculata*, deze prachtige klimplant met zijn mooie diep ingesneden bladeren begint zich nu op zijn mooist te vertonen. De bessen hebben kleuren van groen, turkoois, blauw, paars, roze tot wit.



Indiaanenaardappel, *Apios americana* is een klimplant met leverkleurige bloemen. De plant sterft in de winter bovengronds af, maar komt elk jaar talrijker terug (een beetje woekerend). De knollen kunnen gegeten worden.

Colchicum 'Lilac Wonde', herfsttijloos of ook wel naakte begijntjes genoemd is een bolgewas dat bloeit zonder bladeren. Deze verschijnen pas het volgende voorjaar.

De cultivar heeft wel te grote bloemen, wat ervoor zorgt dat ze nogal vlug neervallen.



Nepeta govianiana, is een gemakkelijke vaste plant, geschikt voor half schaduw.